

アントム顆粒水溶剤

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジノテフランを含む農薬の総使用回数	
ピーマン	コナジラミ類	2000～3000倍	100～300 ℓ/10a	収穫前日まで	2回以内	散布	3回以内（育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計2回以内）	
	アブラムシ類	3000倍						
	アザミウマ類	2000倍						
トマト ミニトマト	コナジラミ類	2000～3000倍						5回以内（育苗期の株元散布は1回以内、定植時の灌水は1回以内、定植時の土壌混和は1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計2回以内）
なす	アブラムシ類	3000倍						3回以内（育苗期の株元散布、定植時の土壌混和及び定植時の株元散布は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計2回以内）
	アザミウマ類	2000倍						4回以内（育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、定植後の株元散布は1回以内、散布は2回以内）
とうがらし類	アブラムシ類	3000倍						4回以内（育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和及び定植時の株元散布は合計1回以内、定植後の株元散布は1回以内、散布は2回以内）
	アザミウマ類	2000倍						4回以内（育苗期の株元散布、定植時の土壌混和及び定植時の株元散布は合計1回以内、定植後の株元散布は1回以内、散布は2回以内）
きゅうり	アブラムシ類 コナジラミ類	2000～3000倍						3回以内（定植時の土壌混和及び灌水は合計1回以内、散布は2回以内）
	アザミウマ類	2000倍						3回以内（育苗期の株元散布、定植時の土壌混和及び灌水は合計1回以内、散布は2回以内）
はくさい	アブラムシ類	2000～3000倍	3回以内（育苗トレイへの灌水は1回以内、散布は2回以内）					
キャベツ			3回以内（は種時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内）					
レタス			3回以内（は種時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内）					
だいこん			3回以内（は種時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内）					
かぶ			3回以内（は種時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内）					
こまつな			キスジノミハムシ	2000倍	収穫7日前まで			
					収穫3日前まで			
			収穫14日前まで					

みずな	アブラムシ類	3000倍		収穫7日 前まで日 前まで																						
	キスジノミハムシ	2000倍																								
ばれいしょ	ワタアブラムシ	2000倍	200~700 ℓ / 10a						収穫前日 まで	3回以内			2回以内													
だいず	カメムシ類													3回以内 (は種時の土壌混和 は1回以内、散布は2回以 内)												
	ダイズサヤタマバエ	3000倍																								
えだまめ	カメムシ類	2000倍																2回以内								
	ダイズサヤタマバエ	3000倍																								
かき	カメムシ類	2000倍											200~700 ℓ / 10a	収穫前日 まで	3回以内				4回以内 (塗布は1回以 内、散布は3回以内)							
	コナカイガラムシ類																									
カキノヘタムシガ																										
チャノキイロアザミウ マ																										
うめ	アブラムシ類	2000倍		100~300 ℓ / 10a	発生初期	4回以内														3回以内						
	カメムシ類																									
花き類・観葉 植物 (ばら、 きく、ガーベ ラを除く)	ハモグリバエ類	1000倍	1 ℓ / m ²						発生初期	4回以内											灌注					
	アブラムシ類	2000~ 3000倍																			散布	5回以内 (定植後は4回以内)				
	コナジラミ類	2000倍																								
きく	アブラムシ類	2000~ 3000倍	1 ℓ / 10a																		発生初期		4回以内			
	カメムシ類	2000倍	1 ℓ / m ²										灌注													
	コナジラミ類																									
ガーベラ	ハモグリバエ類	1000~ 2000倍	1 ℓ / m ²										発生初期	4回以内				灌注								
	アブラムシ類	2000~ 3000倍	100~300 ℓ / 10a															散布								
	コナジラミ類																									
ばら	ハモグリバエ類	1000倍	1 ℓ / m ²	発生初期	5回以内													灌注								
	アブラムシ類	2000~ 3000倍	100~300 ℓ / 10a						散布																	
	コナジラミ類									2000倍																
つつじ類	アブラムシ類	2000倍	100~300 ℓ / 10a						発生初期	5回以内									散布							
	ケムシ類																									
樹木類 (つつじ類 を除く)	ケムシ類	2000倍	100~700 ℓ / 10a																発生初期	5回以内				散布		