

半促成ナス向けBSプログラム

(株)ハイポネックスジャパン

時 期		12月			1月			2月			3月			4月			5月			6月								
		上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬						
関東 施設ナス 半促成栽培		育苗期																										
					定植期																							
								生育期																				
								収穫期																				
商品	施用																											
マイコジェル 【ジェル状高濃度菌根菌】 育苗期～定植時まで	倍率	1,000～2,000倍、100ml/反					※マイコジェルはライゾーと混用可																					
	間隔	1回のみ																										
	施用方法	育苗時灌注 定植時どぶ漬け、定植後灌注																										
ライゾー 【根張り促進型肥料】 育苗期～収穫終了まで	倍率	3,000～5,000倍					100g/反																					
	間隔	7～10日間隔で定期施用																										
	施用方法	育苗時灌注 定植時どぶ漬け					灌注																					
バタヨンNew 【高濃度フルボ酸液肥】 定植期～生育前半	倍率				500ml～1L/反																							
	間隔				7～10日間隔で定期施用																							
	施用方法				灌注																							
ボンバルディア 【アミノ酸、フルボ酸有機活力液肥】 生育期～収穫期	倍率							1～2L/反、500～1,000倍																				
	間隔							7～10日間隔で定期施用																				
	施用方法							灌注、葉面散布																				
商品	施用																											
グリベテン 【高温対策、カルシウム、ホウ素供給】 高温ストレスを受ける前から	倍率													500倍														
	間隔													7～10日間隔で定期施用														
	施用方法													薬散時混用散布														
パナケアMA Original 【ストレス軽減、光合成促進】 天候不順によるストレス時	倍率										500～1,000倍																	
	間隔										7～10日間隔で定期施用																	
	施用方法										薬散時混用散布																	
フォスビットK 【亜リン酸液肥】 開花、肥大の促進に、窒素過多時	倍率										1,000～2,000倍、500ml～1L/反																	
	間隔										7～10日間隔で定期施用																	
	施用方法										葉面散布、灌注																	

※石灰硫黄合剤や銅剤、浸透移行性の強い農薬との混用はお避け下さい。