



BS資材使用方法

モモ

地域 本州

作型 露地栽培

出 蕾 期

①3月頃



ライゾー マイコエナジー

効 果	ライゾー	根張り促進
	マイコエナジー	菌根菌感染率向上
倍 率	ライゾー	3,000~5,000倍 (100g/10a)
	マイコエナジー	1,000倍 (1L/10a)
施用方法	混用して灌注	
施用間隔	7~10日に1回 (3~4回)	

開花期以降

①消毒時の定期散布に



ボンバルディア ニ

効 果	ボンバルディア	養分転流促進、糖度向上
	ニ	—
倍 率	ボンバルディア	500~1,000倍 (1L/10a)
	ニ	—
施用方法	葉面散布	
施用間隔	7~10日に1回	

②高温による葉焼け対策に



グリベテンNK ニ

効 果	グリベテンNK	熱ストレス軽減、Ca、ホウ素供給
	ニ	—
倍 率	グリベテンNK	500~1000倍
	ニ	—
施用方法	葉面散布	
施用間隔	7~10日に1回 (2~3回)	

③収穫後のお礼肥前に



ライゾー ボンバルディア

効 果	ライゾー	根張り促進
	ボンバルディア	養分供給、肥料吸収促進
倍 率	ライゾー	3,000~5,000倍 (100g/10a)
	ボンバルディア	500~1,000倍 (1L/10a)
施用方法	混用して灌注	
施用間隔	10~14日に1回	