

## 出 蕾 期

### ① 3～4月頃



ライゾー      マイコエナジー

効 果	ライゾー 根張り促進 マイコエナジー 菌根菌感染率向上
倍 率	ライゾー 3,000～5,000倍 (100g/10a) マイコエナジー 1,000倍 (1L/10a)
施用方法	混用して灌注
施用間隔	7～10日に1回 (3～4回)

## 開花期以降

### ① 消毒時の定期散布に



ボンバルディア      二

効 果	ボンバルディア 養分転流促進、糖度向上 —
倍 率	ボンバルディア 500～1,000倍 (1L/10a) —
施用方法	葉面散布
施用間隔	7～10日に1回

### ② 高温による葉焼け対策に



グリベテンNK      二

効 果	グリベテンNK 熱ストレス軽減、Ca、ホウ素供給 —
倍 率	グリベテンNK 500～1000倍 —
施用方法	葉面散布
施用間隔	7～10日に1回 (2～3回)

### ③ 収穫後のお礼肥前に



ライゾー      ボンバルディア

効 果	ライゾー 根張り促進 ボンバルディア 養分供給、肥料吸収促進
倍 率	ライゾー 3,000～5,000倍 (100g/10a) ボンバルディア 500～1,000倍 (1L/10a)
施用方法	混用して灌注
施用間隔	10～14日に1回