

かんきつ

開花期

① 3～4月頃



ライゾー マイコエナジー

| | | |
|------|-----------------|-------------------------|
| 効 果 | ライゾー | 根張り促進 |
| | マイコエナジー | 菌根菌感染率向上 |
| 倍 率 | ライゾー | 3,000～5,000倍 (100g/10a) |
| | マイコエナジー | 1,000倍 (1L/10a) |
| 施用方法 | 混用して灌注 | |
| 施用間隔 | 7～10日に1回 (3～4回) | |

開花期以降

① 消毒時の定期散布に



ボンバルディア 二

| | | |
|------|----------|---------------------|
| 効 果 | ボンバルディア | 養分転流促進、糖度向上 |
| | — | — |
| 倍 率 | ボンバルディア | 500～1,000倍 (1L/10a) |
| | — | — |
| 施用方法 | 葉面散布 | |
| 施用間隔 | 7～10日に1回 | |

② 高温による葉焼け対策に



グリベテンNK 二

| | | |
|------|-----------------|------------------|
| 効 果 | グリベテンNK | 熱ストレス軽減、Ca、ホウ素供給 |
| | — | — |
| 倍 率 | グリベテンNK | 500～1000倍 |
| | — | — |
| 施用方法 | 葉面散布 | |
| 施用間隔 | 7～10日に1回 (2～3回) | |

③ 低日照時、ストレス時



パナケアMAOriginal 二

| | | |
|------|----------------|---------------------------|
| 効 果 | パナケアMAOriginal | 光合成促進、環境ストレス軽減 |
| | — | — |
| 倍 率 | パナケアMAOriginal | 500～1000倍 (200～400ml/10a) |
| | — | — |
| 施用方法 | 葉面散布 | |
| 施用間隔 | 7～10日に1回 | |