

## 育苗期

### ① 出芽期（播種7～10日）



ライゾー

効 果	ライゾー	根張り促進
倍 率	ライゾー	3,000～5,000倍 (100g/10a)
施用方法	散布	
施用間隔	1回処理	

### ② 出芽揃い期（播種10～14日）



ライゾー ボンバルディア

効 果	ライゾー	根張り促進、活着促進
	ボンバルディア	初期生育促進
倍 率	ライゾー	3,000～5,000倍 (100g/10a)
	ボンバルディア	500～1,000倍 (1L/10a)
施用方法	混用して散布	
施用間隔	1回処理	

## 葉面散布

### ① 生育期の定期散布



ボンバルディア

効 果	ボンバルディア	生育促進
倍 率	ボンバルディア	500～1,000倍 (1L/10a)
施用方法	葉面散布	
施用間隔	7～14日に1回（農薬混用可）	

### ② 高温期の葉先枯れ軽減に



グリベテンNK

効 果	熱ストレス軽減、Ca、ホウ素供給	
倍 率	500～1000倍	
施用方法	葉面散布	
施用間隔	7日に1回（農薬混用可）	

### ③ 生育期全般の代謝改善に



パナケアMAOriginal

効 果	光合成促進、環境ストレス軽減	
倍 率	500～1000倍 (200～400ml/10a)	
施用方法	葉面散布	
施用間隔	7～10日に1回（農薬混用可）	