



有機活力液肥

ボンバルディア

アミノ酸、

フルボ酸、

多糖類で

生育促進!

■成分

保証成分量	
窒素全量	8.0%

その他の成分	
アミノ酸…13.0%、フルボ酸…23.1% 多糖類、カルシウム、鉄、亜鉛、ベタイン、他	

 **BOMBARDIER®**

有機活力液肥
ボンバルディア
1ℓ / 20ℓ




株式会社 **ハイポネックス ジャパン**

自然のチカラで作物を強くする

特長

- 肥料成分と微量元素のほか、アミノ酸、フルボ酸(腐植)、ペプチド、ベタイン、多糖類などを多く含んだバイオスティミュラント資材です。
- 土壌構造の改良と植物の品質向上のダブル効果が得られます。また、栽培過程や環境ストレスを軽減することで健やかに生育し収穫量が増加します。



性状:液体



1ℓ




20ℓ

施用事例

トマトの尻腐れ症や作物の収量アップに効果を発揮!

■トマトの尻腐れ個数



■トマト



未使用



ボンバルディア使用

あらゆる植物、生育ステージにも使用できます。



イチゴ



バラ

■ブドウ

収穫量が増加!



未使用



ボンバルディア使用



水稻



ミカン

施用方法

作物	施用時期	施用量・倍率
水稻	出穂前、出穂後の2回	ドローン散布:10倍・葉面散布:1,000倍
豆類	開花時、肥大前期、肥大後期の3回	ドローン散布:10倍・葉面散布:500倍
果菜類	7~10日間隔	灌注:1~2ℓ/10a・葉面散布:1,000倍
葉菜類	定植後・または本葉展開15日、30日の2回	葉面散布:500倍
イモ類	定植後10日頃から塊茎の肥大期まで3~4回	
球根野菜	球根の生育から収穫まで	
柑橘類	開花から肥大終了まで3~4回	灌注:1~2ℓ/10a
果樹類	萌芽期~果実肥大期まで5~7回	
イチゴ	定植7日後から10日間隔	灌注:1,000倍
ブドウ	開花から着色期まで10~15日間隔	
花き類	移植・定植後から出荷直前まで	

*施用時期、施用量・倍率は目安のため栽培条件で変わることがあります。一度お試しのうえ、ご使用ください。

*「石灰硫黄合剤」と混合すると、有毒ガスが発生する恐れがあり、危険ですから混用は行わないこと。


ボンバルディアの配合成分による効果

15種のL型アミノ酸(13.0%)

- 作物に早く吸収される
- 光合成促進
- 体内水分調整

フルボ酸(23.1%)

- 微生物活性向上
- 土壌養分、ミネラルをキレート化



詳しい内容、
注意事項は
こちら

