



高濃度フルボ酸液肥

バタヨン

植物の生育に 適した土壌に 素早く回復!

土壌改良
品質向上

肥料吸収
効率改善

低分子フルボ酸
による根張り強化
(主根、一次根)

■成分

保証成分量	
加里全量	5.0%
その他の成分	
フルボ酸...	37.6%

batallón

高濃度フルボ酸液肥

バタヨン

1ℓ / 20ℓ



株式会社 **ハイポネックス** ジャパン

特長

- フルボ酸と有機物を多く含む液肥で、土壌改良効果と秀品率向上効果が得られます。
- フルボ酸が作物の根を刺激し、根張りを改善します。
また、低温時、極端なpH時、作物への負担が大きい時など、環境ストレスを軽減します。
- カリを含み、果菜類や塊茎作物などに素早く吸収させ、カリ欠乏の予防や果実肥大に効果的です。



性状：液体



1ℓ



20ℓ

施用事例

■ラナンキュラス



未使用



バタヨン

リン酸の吸収率が悪くなる低温期に使用することで、リン酸の吸収が促進され花上がりがよくなる!

■ピンカ



未使用



バタヨン+ライゾー

バタヨンの根張り強化効果×ライゾーの毛細根の活性化効果を組み合わせることで、根巻きのよい苗および活着促進ができる!

■水稻




バタヨン+ライゾー

路地栽培のため寒暖差が大きく、4月は遅霜に3回当たったが、黄化はみられなかった。根の状態も非常に良好で、田植え後の初期生育も安定!

フルボ酸の効果

フルボ酸がリン酸とアルミニウムなどの結合をはがします。



施用方法

作物	施用時期	施用量・倍率
果菜類	10～15日間隔 ストレスがかかるタイミングで適宜	土壌灌注：500～1,000倍、1～2ℓ/10a
葉菜類	定植後15日、30日の2回	
花き類	定植初期、低温期に10～15日間隔	
イモ類(ジャガイモなど)	塊茎の分化から終了まで2～4回	土壌灌注：500～1,000倍、1ℓ/10a
球根野菜(タマネギなど)	球根の育苗期から肥大後期まで	土壌灌注：500～1,000倍、0.5～1ℓ/10a
果樹類	着果から収穫まで2～4回	土壌灌注：500～1,000倍、1～2ℓ/10a

*施用時期、施用量・倍率は目安のため栽培条件で変わることがあります。一度お試しのうえ、ご使用ください。

*「石灰硫黄合剤」と混合すると、有毒ガスが発生する恐れがあり、危険ですから混用は行わないこと。

詳しい内容、
注意事項は
こちら



株式会社 ハイポネックス ジャパン 農芸プロダクツ部

〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-1-9 TEL 06-6396-0801 <https://www.hyponex.co.jp>